

Steiermark - Männer: Gestorbene nach Todesursachen seit 1970											
	Insgesamt	Todesursachen-Hauptgruppen									
		Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen				
in Prozent											
1970	100,0%	17,7%	41,3%	10,0%	6,7%	12,4%	11,7%				
1971	100,0%	18,7%	41,5%	7,1%	7,0%	12,2%	13,4%				
1972	100,0%	18,9%	44,5%	5,2%	6,9%	11,8%	12,8%				
1973	100,0%	19,9%	42,2%	7,3%	6,9%	11,3%	12,5%				
1974	100,0%	19,6%	45,0%	5,6%	6,3%	11,1%	12,4%				
1975	100,0%	19,0%	45,0%	6,3%	7,0%	10,9%	11,7%				
1976	100,0%	19,0%	46,0%	6,4%	6,8%	10,7%	11,1%				
1977	100,0%	20,2%	45,4%	5,5%	7,3%	10,0%	11,6%				
1978	100,0%	20,1%	45,6%	5,8%	7,2%	9,7%	11,6%				
1979	100,0%	21,4%	44,8%	5,0%	7,1%	10,6%	11,2%				
1980	100,0%	21,5%	47,8%	4,9%	6,3%	8,5%	11,0%				
1981	100,0%	20,6%	48,0%	4,9%	6,6%	9,0%	10,9%				
1982	100,0%	20,9%	47,8%	4,8%	6,6%	8,6%	11,3%				
1983	100,0%	20,2%	46,5%	6,4%	6,9%	8,0%	12,0%				
1984	100,0%	22,2%	45,8%	5,4%	7,5%	7,8%	11,3%				
1985	100,0%	21,4%	46,1%	6,6%	7,2%	8,1%	10,6%				
1986	100,0%	21,5%	46,8%	5,6%	7,1%	8,3%	10,7%				
1987	100,0%	22,9%	46,0%	5,7%	6,9%	8,3%	10,2%				
1988	100,0%	23,6%	46,5%	5,0%	6,6%	7,7%	10,7%				
1989	100,0%	24,0%	45,4%	5,8%	6,8%	8,1%	10,0%				
1990	100,0%	24,1%	45,1%	5,8%	6,7%	8,4%	9,8%				
1991	100,0%	25,1%	44,8%	5,6%	6,4%	8,6%	9,5%				
1992	100,0%	25,0%	45,8%	5,3%	6,7%	8,0%	9,3%				
1993	100,0%	26,2%	44,9%	5,7%	6,8%	7,6%	8,7%				
1994	100,0%	26,1%	46,0%	4,2%	6,6%	7,2%	9,9%				
1995	100,0%	25,4%	46,0%	5,6%	6,3%	7,0%	9,7%				
1996	100,0%	26,2%	47,2%	4,6%	6,0%	7,0%	9,1%				
1997	100,0%	26,1%	48,7%	4,2%	5,6%	6,7%	8,6%				
1998	100,0%	26,5%	48,0%	4,9%	5,4%	6,6%	8,7%				
1999	100,0%	26,6%	48,5%	5,5%	4,7%	6,4%	8,3%				
2000	100,0%	28,0%	46,3%	4,8%	5,8%	7,1%	8,0%				
2001	100,0%	27,6%	45,0%	5,2%	5,8%	8,5%	7,9%				
2002	100,0%	28,8%	41,2%	5,8%	5,2%	10,2%	8,8%				
2003	100,0%	28,2%	37,4%	7,1%	6,1%	12,2%	8,9%				
2004	100,0%	28,0%	38,9%	6,4%	5,1%	13,6%	8,0%				
2005	100,0%	27,5%	37,0%	6,8%	5,6%	14,4%	8,8%				
2006	100,0%	28,2%	37,9%	6,2%	4,7%	14,3%	8,7%				
2007	100,0%	28,7%	38,6%	6,7%	4,9%	13,1%	8,1%				
2008	100,0%	29,4%	37,8%	5,7%	5,0%	14,0%	8,1%				
2009	100,0%	27,8%	38,6%	5,2%	4,6%	16,0%	7,9%				
2010	100,0%	28,5%	38,6%	5,7%	5,1%	14,9%	7,2%				
2011	100,0%	27,8%	37,9%	5,8%	4,7%	16,3%	7,6%				
2012	100,0%	28,9%	37,3%	5,7%	4,3%	16,4%	7,4%				
2013	100,0%	28,3%	37,6%	5,2%	4,2%	16,9%	7,7%				
2014	100,0%	29,3%	38,3%	5,2%	3,8%	15,8%	7,5%				
2015	100,0%	27,2%	37,3%	5,9%	4,1%	17,8%	7,7%				
2016	100,0%	27,2%	37,4%	6,1%	4,1%	18,3%	6,9%				
2017	100,0%	28,6%	34,4%	6,8%	4,1%	18,4%	7,7%				
2018	100,0%	28,2%	35,4%	6,6%	3,4%	18,8%	7,5%				
2019	100,0%	27,4%	35,6%	6,2%	4,0%	19,4%	7,3%				
2020	100,0%	25,3%	32,9%	5,3%	4,3%	25,2%	7,0%				
2021	100,0%	25,3%	31,5%	4,5%	4,0%	28,0%	6,5%				
2022	100,0%	24,8%	31,3%	5,4%	4,0%	27,1%	7,4%				
2023	100,0%	26,1%	32,6%	6,1%	4,6%	22,9%	7,7%				

Quelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik ; Bearbeitung und Berechnung: Landesstatistik Steiermark.